

# Vyjádření ARIA - EAACI k používání alergénové imunoterapie v období COVID-19

## **Doporučení pro pacienty neinfikované virem COVID-19 nebo pro pacienty uzdravené:**

1. Přerušování SCIT není obecně doporučováno. Důraz je kladen zejména na to, že u potenciálně život ohrožujících alergií, jako je alergie na hmyzí jedy, by mělo být ve SCIT pokračováno zcela beze změn. V udržovací fázi léčby by měly být plánovány takové intervaly aplikací SCIT, aby existovala případně možnost jejich prodloužení v případě potřeby.

2. Přerušování SLIT není doporučováno. Je vhodné, aby pacient měl zásobu své léčby minimálně na 14 dnů pro případ možné karantény. Výhodou SLIT je aplikace doma, neboť snižuje riziko kontaktu s potenciálně infikovanou osobou ve zdravotnickém zařízení.

**Pro SCIT i SLIT tedy platí, že může být aplikována jakémukoli pacientovi bez symptomů COVID-19, u kterého není podezření na COVID-19 infekci a/nebo podezření na kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Dále může být aplikována pacientovi s negativním testem (RT-PCR) nebo každému po adekvátní karanténě nebo s pozitivitou protilátek IgG (bez IgM) na SARS COV 2.**

## **Doporučení pro pacienty infikované virem COVID-19 nebo s podezřením na tuto infekci:**

SCIT i SLIT by u těchto pacientů měla být přerušena. Měla by být přerušena i u pacientů se symptomy odpovídajícími COVID-19, u pacientů s kontaktem s COVID-19 a u pacientů s pozitivním testem (RT PCR).

Tato pravidla mohou být dočasná a mohou se měnit s novými informacemi o COVID-19.

Detailní informaci najdete na <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/all.14336>